

Elegibilidad para la vacuna de COVID-19

Utilice esta tabla para ayudar a determinar cuándo administrar la vacuna COVID-19 en relación con la edad o las condiciones de salud.

| Dosis | Edad: | 5-11 | 12-17 | 18-49 | 50-64 | 65+ |
|--|--|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
| Pfizer | Dos dosis iniciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dosis adicional (3a) para personas inmunodeficientes por lo menos 28 días después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer | | *Adolescentes 16-17 Puede recibir | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dosis de refuerzo de Pfizer (media dosis) o marca diferente por lo menos 6 meses después de la segunda dosis de Pfizer | | | ✓ Puede recibir | ✓ Puede recibir | ✓ |
| | • Residente en un centro de asistencia a largo plazo | | | ✓ | ✓ | |
| | • Afección médica subyacente o mayor riesgo de inequidades sociales | | | ✓ Puede recibir | ✓ | |
| | • Mayor riesgo de exposición por el lugar de trabajo o el entorno institucional | | | ✓ Puede recibir | ✓ Puede recibir | |
| * Los adolescentes de 16 a 17 años pueden recibir un refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (CDC 12.09.2021) | | | | | | |
| Moderna | Dos dosis iniciales | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dosis adicional (3a) para personas inmunodeficientes por lo menos 28 días después de la segunda dosis de Moderna | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dosis de refuerzo de Moderna (media dosis) o marca diferente por lo menos 6 meses después de la segunda dosis de Moderna | | | ✓ Puede recibir | ✓ Puede recibir | ✓ |
| | • Residente en un centro de asistencia a largo plazo | | | ✓ | ✓ | |
| | • Afección médica subyacente o mayor riesgo de inequidades sociales | | | ✓ Puede recibir | ✓ | |
| | • Mayor riesgo de exposición por el lugar de trabajo o el entorno institucional | | | ✓ Puede recibir | ✓ Puede recibir | |
| Johnson & Johnson | Dosis primaria | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dosis de refuerzo de J&J o marca diferente por lo menos 2 meses después de la dosis inicial | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Refuerzos combinados:

Se puede administrar una sola dosis de refuerzo como dosis de refuerzo combinado después de cualquier vacuna de COVID-19 aprobada, después de consultar con el proveedor de atención médica, o por preferencia individual, disponibilidad o conveniencia.

Visit: <https://www.sonomavalleyhospital.org/coronavirus-19>

Información actualizada el día 23/11/21 FUENTE: CDC y CA-DPH

